

| レジメン名 | ABVd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-----|-------|---------|----------|----------|---------------------|----------|---------|--------------------------------|----------|---------|-------------------------------|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 適応病名(癌腫) | ホジキンリンパ腫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適応分類 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1クール日数 | 28 日 (休薬期間含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経口抗癌剤併用 | <input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・15</td> <td>ドキシソルビシン</td> <td>25mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1・15</td> <td>ブレオマイシン</td> <td>10mg/m²(max 15mg)</td> </tr> <tr> <td>day 1・15</td> <td>ビンブラスチン</td> <td>6mg/m²(max 10mg)</td> </tr> <tr> <td>day 1・15</td> <td>ダカルバジン</td> <td>250mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | 投与日 | 抗癌剤名称 | 投与量(単位) | day 1・15 | ドキシソルビシン | 25mg/m ² | day 1・15 | ブレオマイシン | 10mg/m ² (max 15mg) | day 1・15 | ビンブラスチン | 6mg/m ² (max 10mg) | day 1・15 | ダカルバジン | 250mg/m ² | | | |
| 投与日 | 抗癌剤名称 | 投与量(単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1・15 | ドキシソルビシン | 25mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1・15 | ブレオマイシン | 10mg/m ² (max 15mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1・15 | ビンブラスチン | 6mg/m ² (max 10mg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1・15 | ダカルバジン | 250mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 総投与量はドキシソルビシン塩酸塩として500mg(力価)/m ² 以下とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エビデンス資料 | Int J Hematol. 2010 Dec;92(5):713-24. PMID: 21076995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |