

| レジメン名 | AZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----|-------|---------|---------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 適応病名(癌腫) | 骨髄異形成症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適応分類 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1クール日数 | 28 日 (休薬期間含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経口抗癌剤併用 | <input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1-7</td> <td>アザシチジン</td> <td>75mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | 投与日 | 抗癌剤名称 | 投与量(単位) | day 1-7 | アザシチジン | 75mg/m ² | | | | | | | | | | | | |
| 投与日 | 抗癌剤名称 | 投与量(単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1-7 | アザシチジン | 75mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エビデンス資料 | Lancet Oncol. 2009 Mar;10(3):223-32. PMID: 19230772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |