

レジメン名	CBDCA+PTX+Atezolizumab+BEV		
適応病名(癌腫)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌のみ)		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし		
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC			
	投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
	day 1	カルボプラチン	AUC 6
	day 1	パクリタキセル	175 mg/m ²
	day 1	アテゾリズマブ	1200 mg/body
	day 1	ベバシズマブ	15 mg/kg
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度			
その他	Atezolizumab初回は1時間投与、忍容性が良好であれば、2回目以降は0.5時間投与。 4~6サイクル終了後、増悪を認めなければAtezolizumab+BEV併用の維持療法を考慮する。 PTXの投与量は、アジア人では200mg/m ² →175mg/m ² に設定。		
エビデンス資料	N Engl J Med. 2018 Jun 14;378(24):2288-2301. (PMID: 29863955)		