

レジメン名	CDDP+PEM+Pembrolizumab		
適応病名(癌腫)	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌のみ)		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他		
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし		
単位: mg/m <sup>2</sup> 、mg/kg、mg/body、AUC			
	投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
	day 1	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>
	day 1	ペトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>
	day 1	ペムブロリズマブ	200 mg/body
* 催吐性リスク分類 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">高度</span> 中等度 軽度 最小度			
その他	PEM治療開始7日前より葉酸0.5mgを1日1回連日経口投与、ビタミンB12を1回1mg筋注する(9週間に1回)最終のPEM投与日から22日目まで可能な限り投与を継続する。 4サイクル終了後、増悪を認めなければPEM+Pembrolizumab併用の維持療法を考慮する。		
エビデンス資料	N Engl J Med. 2018 May 31;378(22):2078-2092.(PMID: 29658856)		