				OMPB	レジメン名
		腫	性骨骼	未治療の多発	適応病名(癌腫)
その他	□術後化学療法	□術前化学療法		■進行・再発	適応分類
		(休薬期間含む)	日	42	1クール日数
	□なし		アラン)	■あり(メルフ	経口抗癌剤併用
C	□なし ´m゚、mg/kg、mg/body、	単位 : ms	アラン)	■あり(メルフ	経口抗癌剤併用

* 1サイクル

投与日	抗癌剤名称 投与量(単位	
day 1-8-15-22-29-36	ダラツムマブ 16mg/l	
day 1·4·8·11·22·25·29·32	ボルテゾミブ	1.3mg/ m ²
day 1-4	メルファラン	9mg∕ m i̇́
day 2-4	プレドニゾロン	60mg/ m ²

* 2-9サイクル

投与日	抗癌剤名称 投与量(単位		
day 1 • 22	ダラツムマブ 16mg/k		
day 1•8•22•29	ボルテゾミブ	1.3mg/ m ^⁴	
day 1-4	メルファラン	9mg∕ m i̇́	
day 2-4	プレドニゾロン	60mg/ m ²	

* 10サイクル以降

投与日	抗癌剤名称 投与量(単位)		
day 1	ダラツムマブ	16mg/kg	

*催吐性リスク分類	\rightarrow	高度	中等度	軽度	最小度
					•

その他	ダラツムマブ前投薬としてデキサメタゾン20mg/body投与あり
エビデンス資料	Leuk Lymphoma. 2020 Mar;61(3):714-720. PMID: 31686559