

レジメン名	DXR																				
適応病名(癌腫)	悪性軟部腫瘍(非円形細胞肉腫)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21	日	(休薬期間含む)																		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり()		<input checked="" type="checkbox"/> なし																		
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>ドキソルビシン</td> <td>75 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	ドキソルビシン	75 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	ドキソルビシン	75 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他																					
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2014; 15(4): 415-423. (PMID: 24618336)																				