

レジメン名	ELd		
適応病名(癌腫)	再発または難治性の多発性骨髄腫		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり(レナリドミド)		<input type="checkbox"/> なし
単位 : mg/m <sup>2</sup> 、mg/kg、mg/body、AUC			
* 1-2サイクル			
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	
day 1・8・15・22	エロツズマブ	10mg/kg	
day 1-21	レナリドミド	25mg/body	
day 1・8・15・22	デキサメタゾン	経口28mg/body	
day 1・8・15・22	デキサメタゾン	静注6.6mg/body	
* 3サイクル以降			
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	
day 1・15	エロツズマブ	10mg/kg	
day 1-21	レナリドミド	25mg/body	
day 1・15	デキサメタゾン	経口28mg/body	
day 1・15	デキサメタゾン	静注6.6mg/body	
day 8・22	デキサメタゾン	経口40mg/body	
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">軽度</span> 最小度			
その他			
エビデンス資料	N Engl J Med. 2015 Aug 13;373(7):621-31. PMID: 26035255		