

レジメン名	Eribulin																		
適応病名(癌腫)	悪性軟部腫瘍																		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																		
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																		
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・8</td> <td>エリ布林</td> <td>1.4 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1・8	エリ布林	1.4 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																	
day 1・8	エリ布林	1.4 mg/m ²																	
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																			
その他	二次治療以降の選択肢。 L-サルコーマに対してより高い効果が認められる。 選択される組織型は脂肪肉腫・平滑筋肉腫																		
エビデンス資料	Lancet. 2016 Apr 16;387(10028):1629-37.(PMID: 26874885)																		