

レジメン名	Erlotinib+RAM																				
適応病名(癌腫)	非小細胞肺癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																		
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり (Erlotinib)		<input type="checkbox"/> なし																		
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 45%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 30%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1-14</td> <td>エルロチニブ</td> <td>150 mg/day</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>ラムシルマブ</td> <td>10 mg/kg</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1-14	エルロチニブ	150 mg/day	day 1	ラムシルマブ	10 mg/kg									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1-14	エルロチニブ	150 mg/day																			
day 1	ラムシルマブ	10 mg/kg																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	EGFR遺伝子変異陽性(エクソン19欠失またはL858R変異陽性) Erlotinibは食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回投与																				
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2019 Dec;20(12):1655-1669.(PMID: 31591063)																				