

レジメン名	GEM																				
適応病名(癌腫)	胆道癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・8・15</td> <td>ゲムシタビン</td> <td>1000 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1・8・15	ゲムシタビン	1000 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1・8・15	ゲムシタビン	1000 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他																					
エビデンス資料	Cancer Chemother Pharmacol. 2006 May;57(5):647-53. (PMID: 16142487)																				