

レジメン名	GEM																				
適応病名(癌腫)	乳癌(HER2陰性)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																		
1クール日数	21	日	(休薬期間含む)																		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり()	<input checked="" type="checkbox"/> なし																			
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 45%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 30%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day1 ,8</td> <td>ゲムシタビン</td> <td>1250 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day1 ,8	ゲムシタビン	1250 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day1 ,8	ゲムシタビン	1250 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他																					
エビデンス資料	Jpn J Clin Oncol. 2009 Nov;39(11):699-706. (PMID: 19776022)																				