

レジメン名	GEM																				
適応病名(癌腫)	卵巣癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位: mg/m <sup>2</sup> 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・8・15</td> <td>ゲムシタビン</td> <td>1000 mg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1・8・15	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1・8・15	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>																			
* 催吐性リスク分類    →    高度    中等度 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">軽度</span> 最小度																					
その他																					
エビデンス資料	J Clin Oncol. 2007 Jul 1;25(19):2811-8. (PMID: 17602086)																				