

レジメン名	PTX+CBDCA+BEV		
適応病名(癌腫)	卵巣癌		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他		
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし		
単位: mg/m <sup>2</sup> 、mg/kg、mg/body、AUC			
	投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
	day 1	ベバシズマブ	15 mg/kg
	day 1	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>
	day 1	カルボプラチン	AUC 5-6
* 催吐性リスク分類 → 高度 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">中等度</span> 軽度 最小度			
その他	BEVは、創傷治癒の合併症のリスクを減らすため2クール目より併用。6クール以降は維持療法としてBEVのみをPD (増悪)まで継続。		
エビデンス資料	N Engl J Med. 2011 Dec 29;365(26):2473-83. (PMID: 22204724) Lancet Oncol. 2017 Jun;18(6):779-791. (PMID: 28438473)		