

レジメン名	Panitumumab+FOLFIRI																				
適応病名(癌腫)	結腸・直腸癌(KRAS遺伝子野生型)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>パニツムマブ</td> <td>6 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>レボホリナート</td> <td>200 mg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>イリノテカン</td> <td>150 mg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>フルオロウラシル(急速静注)</td> <td>400 mg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>day 1-3 (46hr)</td> <td>フルオロウラシル(持続静注)</td> <td>2400 mg/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	パニツムマブ	6 mg/kg	day 1	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	day 1	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m <sup>2</sup>	day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	パニツムマブ	6 mg/kg																			
day 1	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>																			
day 1	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>																			
day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m <sup>2</sup>																			
day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">中等度</span> 軽度    最小度																					
その他	RAS/BRAF 遺伝子野生型で原発巣占居部位が左側で推奨される。																				
エビデンス資料	J Cancer Res Clin Oncol.2012;138(1):65-72.(PMID: 21960318) J Clin Oncol. 2010 Nov 1;28(31):4706-13.(PMID: 209214622)																				