

レジメン名	Vd																			
適応病名(癌腫)	再発または難治性の多発性骨髄腫																			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																			
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																			
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																			
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 45%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 30%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・4・8・11</td> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1・2・4・5・8・9・11・12</td> <td>デキサメタゾン</td> <td>20mg/body</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1・4・8・11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day 1・2・4・5・8・9・11・12	デキサメタゾン	20mg/body									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																		
day 1・4・8・11	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²																		
day 1・2・4・5・8・9・11・12	デキサメタゾン	20mg/body																		
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																				
その他	9サイクル以降は継続または維持療法(週1回, 4週投与し13日間休薬(23-35日目)する)を選択																			
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2011 May;12(5):431-40. PMID: 21507715 Haematologica. 2012 Dec;97(12):1925-8. PMID: 22689676																			