

レジメン名	Kd(週2回投与)																				
適応病名(癌腫)	再発または難治性の多発性骨髄腫																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 45%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 30%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1・2・8・9・15・16</td> <td>カルフィルゾミブ</td> <td>56mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1・2・8・9・15・16・22・23</td> <td>デキサメタゾン</td> <td>20mg/body</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1・2・8・9・15・16	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	day 1・2・8・9・15・16・22・23	デキサメタゾン	20mg/body									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1・2・8・9・15・16	カルフィルゾミブ	56mg/m ²																			
day 1・2・8・9・15・16・22・23	デキサメタゾン	20mg/body																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	カルフィルゾミブ投与量: 1サイクル day 1・2は20mg/m ² 体表面積: 最大2.2m ² が最大設定																				
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2016 Jan;17(1):27-38. PMID: 26671818																				