

レジメン名	AC																				
適応病名(癌腫)	乳癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位:mg/m ²																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>ドキソルビシン</td> <td>60 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>シクロホスファミド</td> <td>600 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	ドキソルビシン	60 mg/m ²	day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	ドキソルビシン	60 mg/m ²																			
day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	術後化学療法は4サイクルまで。 転移・再発は6サイクルまで。																				
エビデンス資料	J Clin Oncol. 1990 Sep;8(9):1483-96. (PMID: 2202791) J Clin Oncol. 2002 Jul 15;20(14):3114-21. (PMID: 12118025)																				