

レジメン名	adjuvant PTX																			
適応病名(癌腫)	乳癌(リンパ節転移陽性、HER2陰性)																			
適応分類	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																			
1クール日数	7 日 (休薬期間含む)																			
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>パクリタキセル</td> <td>80 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	パクリタキセル	80 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																		
day 1	パクリタキセル	80 mg/m ²																		
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																				
その他	AC療法後に12サイクル投与。 乳房温存手術を希望する場合は、術前化学療法として術後化学療法と同様に使用される。																			
エビデンス資料	N Engl J Med. 2008 Apr 17;358(16):1663-71. (PMID:18420499) J Clin Oncol. 2015 Jul 20;33(21):2353-60. (PMID: 26077235)																			