

レジメン名	TCH																				
適応病名(癌腫)	乳癌(HER2陽性)																				
適応分類	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>ドセタキセル</td> <td>75 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>シクロホスファミド</td> <td>600 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>トラスツズマブ</td> <td>8 mg/kg</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	ドセタキセル	75 mg/m ²	day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²	day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	ドセタキセル	75 mg/m ²																			
day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²																			
day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	Trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与を行う。 Day2にペグフィルグラスチム/3.6mg投与。																				
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2013 Oct;14(11):1121-1128. (PMID:24007746) Breast Cancer. 2017 Jan;24(1):92-97. (PMID: 26874836)																				