

レジメン名	Trastuzumab emtansine																				
適応病名(癌腫)	乳癌 (HER2陽性)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>トラスツズマブ エムタンシン</td> <td>3.6 mg/kg</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg																			
* 催吐性リスク分類    →    高度    中等度 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">軽度</span> 最小度																					
その他	術前化学療法施行後に病理学的完全奏効(pCR)が認められなかった術後患者を対象に14サイクル施行。																				
エビデンス資料	N Engl J Med. 2012 Nov 8;367(19):1783-91.(PMID: 23020162) N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):617-628.(PMID: 30516102)																				