

レジメン名	weekly Trastuzumab																			
適応病名(癌腫)	乳癌(HER2陽性)																			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																			
1クール日数	7 日 (休薬期間含む)																			
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																			
単位:mg/kg																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>トラスツズマブ</td> <td>4 mg/kg</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	トラスツズマブ	4 mg/kg												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																		
day 1	トラスツズマブ	4 mg/kg																		
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																				
その他	Trastuzumabは初回のみ4mg/kg、2回目以降は2mg/kg。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与を行う。Trastuzumabの術前、術後化学療法は1年間。																			
エビデンス資料	J Clin Oncol. 2002 Feb 1;20(3):719-26. (PMID: 11821453) J Natl Cancer Inst . 2005 Feb 2;97(3):188-94. (PMID: 15687361)																			