

レジメン名	SOX+Trastuzumab																				
適応病名(癌腫)	胃癌 (HER2陽性)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり(S-1) <input type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>トラスツズマブ</td> <td>8 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>オキサリプラチン</td> <td>130 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1夕-15朝</td> <td>テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム</td> <td>80 mg/m²/day</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg	day 1	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day 1夕-15朝	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ² /day						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg																			
day 1	オキサリプラチン	130 mg/m ²																			
day 1夕-15朝	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ² /day																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	S-1単剤による術後補助化学療法を除くCDDPが使用できない未治療の胃癌における治療選択肢。 S-1は夕から開始されることが多い。 Trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与を行う。																				
エビデンス資料	Cancer Chemother Pharmacol. 2020 Jan;85(1):217-223. (PMID: 31768696)																				