

レジメン名	XELOX+Nivolumab																			
適応病名(癌腫)	胃癌 (HER2陰性)																			
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																			
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																			
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり (Capecitabine) <input type="checkbox"/> なし																			
単位 : mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>オキサリプラチン</td> <td>130 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>ニボルマブ</td> <td>360 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1夕-15朝</td> <td>カペシタビン</td> <td>2000 mg/m²/day</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day 1	ニボルマブ	360 mg/m ²	day 1夕-15朝	カペシタビン	2000 mg/m ² /day						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																		
day 1	オキサリプラチン	130 mg/m ²																		
day 1	ニボルマブ	360 mg/m ²																		
day 1夕-15朝	カペシタビン	2000 mg/m ² /day																		
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																				
その他	Capecitabineは夕から開始されることが多い。																			
エビデンス資料	Lancet. 2021 Jul 3;398(10294):27-40.(PMID: 34102137) Ann Oncol. 2019 Feb 1;30(2):250-258.(PMID: 30566590)																			