

レジメン名	Trastuzumab+XP (Capecitabine+CDDP)																				
適応病名(癌腫)	胃癌 (HER2陽性)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり (Capecitabine) <input type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>トラスツズマブ</td> <td>8 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>シスプラチン</td> <td>80 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1夕-15朝</td> <td>カペシタビン</td> <td>2000 mg/m²/day</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg	day 1	シスプラチン	80 mg/m ²	day 1夕-15朝	カペシタビン	2000 mg/m ² /day						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	トラスツズマブ	8 mg/kg																			
day 1	シスプラチン	80 mg/m ²																			
day 1夕-15朝	カペシタビン	2000 mg/m ² /day																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・Capecitabineは夕から開始されることが多い。 ・Trastuzumabは初回のみ8mg/kg、2回目以降は6mg/kg。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与を行う。																				
エビデンス資料	Lancet. 2010 Aug 28;376(9742):687-97.(PMID: 20728210)																				