

レジメン名	BEV+FOLFOXIRI		
適応病名(癌腫)	結腸・直腸癌		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他		
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり( ) <input checked="" type="checkbox"/> なし		
単位: mg/m <sup>2</sup> 、mg/kg、mg/body、AUC			
	投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
	day 1	ベバシズマブ	5 mg/kg
	day 1	イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>
	day 1	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>
	day 1	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>
	day 1-3 (48hr)	フルオロウラシル(持続静注)	3200 mg/m <sup>2</sup>
* 催吐性リスク分類 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">高度</span> 中等度 軽度 最小度			
その他	12クールまで施行。維持療法として5-FU/I-LV+BEVを増悪まで継続可能。		
エビデンス資料	N Engl J Med. 2014 Oct 23;371(17):1609-18.(PMID: 25337750)		