

レジメン名	mFOLFOX6																				
適応病名(癌腫)	結腸・直腸癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																		
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり()		<input checked="" type="checkbox"/> なし																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>レボホリナート</td> <td>200 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>オキサリプラチン</td> <td>85 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>フルオロウラシル(急速静注)</td> <td>400 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1-3 (46hr)</td> <td>フルオロウラシル(持続静注)</td> <td>2400 mg/m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	レボホリナート	200 mg/m ²	day 1	オキサリプラチン	85 mg/m ²	day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m ²	day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m ²			
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	レボホリナート	200 mg/m ²																			
day 1	オキサリプラチン	85 mg/m ²																			
day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m ²																			
day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	術後化学療法としては、術後6か月投与。																				
エビデンス資料	N Engl J Med. 2004;350(23): 2343-2351. (PMID: 15175436) Br J Cancer. 2002 Aug 12;87(4):393-9. (PMID: 12177775)																				