

レジメン名	Panitumumab+mFOLFOX6																				
適応病名(癌腫)	結腸・直腸癌(KRAS遺伝子野生型)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>パニツムマブ</td> <td>6 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>レボホリナート</td> <td>200 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>オキサリプラチン</td> <td>85 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>フルオロウラシル(急速静注)</td> <td>400 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1-3 (46hr)</td> <td>フルオロウラシル(持続静注)</td> <td>2400 mg/m²</td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	パニツムマブ	6 mg/kg	day 1	レボホリナート	200 mg/m ²	day 1	オキサリプラチン	85 mg/m ²	day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m ²	day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m ²
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	パニツムマブ	6 mg/kg																			
day 1	レボホリナート	200 mg/m ²																			
day 1	オキサリプラチン	85 mg/m ²																			
day 1	フルオロウラシル(急速静注)	400 mg/m ²																			
day 1-3 (46hr)	フルオロウラシル(持続静注)	2400 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	RAS/BRAF 遺伝子野生型で原発巣占居部位が左側で推奨される。																				
エビデンス資料	Ann Oncol.2014;25(7):1346-1355.(PMID: 24718886) Clin Colorectal Cancer. 2017 Jun;16(2):158-163.(PMID: 28237539)																				