

レジメン名	GCS																				
適応病名(癌腫)	胆道癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	14 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり(S-1) <input type="checkbox"/> なし																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>シスプラチン</td> <td>25 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>ゲムシタビン</td> <td>1000 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1夕-8朝</td> <td>テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム</td> <td>80 mg/m²/day</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	シスプラチン	25 mg/m ²	day 1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day 1夕-8朝	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ² /day						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	シスプラチン	25 mg/m ²																			
day 1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²																			
day 1夕-8朝	テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m ² /day																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	・S-1は夕から開始されることが多い。 ・増悪を認めず忍容性がある限り継続、最大24週。□																				
エビデンス資料	Cancer Chemother Pharmacol.2015;75(2)293-300. (PMID: 25477010) 2022.1現在 最終結果は論文化されていません (Sakai D. et al. 2018 ESMO annual meeting. #6150参照)																				