

レジメン名	EC (EPI+CPA)																				
適応病名(癌腫)	乳癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位:mg/m ²																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>エピルビシン</td> <td>90 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>シクロホスファミド</td> <td>600 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	エピルビシン	90 mg/m ²	day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	エピルビシン	90 mg/m ²																			
day 1	シクロホスファミド	600 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	術後化学療法は4サイクルまで。 エビデンス資料の術後化学療法は、EPI:100mg/m ² +CPA:830mg/m ² 。 転移・再発は6サイクルまで。 エビデンス資料の転移・再発は、EPI:75mg/m ² +CPA:600mg/m ² 。																				
エビデンス資料	J Clin Oncol. 2001 Jun 15;19(12):3103-10.(PMID: 11408507) J Clin Oncol. 2005 Nov 20;23(33):8322-30.(PMID: 16293863) Lancet. 2015 May 9;385(9980):1863-72.(PMID: 25740286)																				