

レジメン名	mLSG15		
適応病名(癌腫)	成人T細胞白血病/リンパ腫 ATLL		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)		
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり()		<input checked="" type="checkbox"/> なし

単位: mg/m²、mg/kg、mg/body、AUC

* mLSG15-1 (VCAP)

投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
day 1	ビンクリスチン	1mg/m ² (Max 2mg)
day 1	シクロホスファミド	350mg/m ²
day 1	ドキソルビシン	40mg/m ²
day 1	プレドニゾン	40mg/m ²

* mLSG15-2 (AMP)

投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
day 8	ドキソルビシン	30mg/m ²
day 8	ラニムスチン	60mg/m ²
day 8	プレドニゾン	40mg/m ²

* mLSG15-3 (VECP)

投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
day 15	ビンデシン	2.4mg/m ²
day 15-17	エトポシド	100mg/m ²
day 15	カルボプラチン	250mg/m ²
day 15-17	プレドニゾン	40mg/m ²

* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度

その他	mLSG15-1→mLSG15-2→mLSG15-3の順に実施
エビデンス資料	J Clin Oncol. 2007 Dec 1;25(34):5458-64. PMID: 17968021